

Hysera® caps 60 000 spu

Dijetetski proizvod - dodatak ishrani

Hysera® caps sadrže enzim serapeptidazu koji ima visoko izraženu enzimsku aktivnost jednaku 60 000 serapeptidaznih jedinica, što omogućava efikasnu hidrolizu proteina i stoga se koristi u tretmanu stanja u čijoj osnovi se nalazi zapaljenje.

Serapeptidaza je proteolitički enzim sa snažnim antiinflamatornim dejstvom koje igra značajnu ulogu u smanjivanju bola koji se javlja usled zapaljenjskih procesa u tkivu, zahvaljujući svojoj sposobnosti da blokira oslobođanje amina koji uzrokuju bol. Ovaj enzim pomaže u održavanju zdravih zglobova, mišića i može pomoći u borbi protiv otoka uzrokovanih različitim vrstama povreda.

Sastav:

Jedna Hysera® caps sadrži 60 000* spu enzima serapeptidaza.

*spu- serapeptidazne jedinice

Namena proizvoda:

Hysera® caps se mogu koristiti:

- Kod različitih povreda i edema (kod uganuća, iščašenja i drugih stanja posle povreda koja su praćena otocima tkiva, u stomatologiji i oralnoj hirurgiji posle intervencija praćenih otocima)
- Za negu sluzokože kod blažih iritacija (kod zapaljenja sluzokože usta i desni praćenih otocima)
- Za respiratori trakt (kod zapuštenog nosa i slivanja sluzi niz ždrelo, za pomoći u razređivanju nakupljene sluzi i olakšavanje iskašljavanja, kao i smanjenje otoka sluzokože)
- Za koštano zglobni, mišični i reproduktivni sistem (posle hirurških intervencija u ortopediji i ginekologiji prilikom kojih dolazi do otoka mekih tkiva)

Upotreba:

Odrasli: 1-2 kapsule dnevno jedan sat pre ili dva sata posle obroka sa oko 200 ml vode.

Napomene:

Preporučena dnevna doza se ne sme prekoračiti.

Dodaci ishrani se ne mogu koristiti kao zamena za raznovrsnu i uravnoteženu ishranu!
Čuvati van domaćaja dece.

Upozorenja:

Proizvod ne smeju da koriste osobe preosetljive na bilo koji sastojak proizvoda.

Ne preporučuje se upotreba proizvoda kod osoba koje imaju sklonost ka krvarenju i neposredno pre hirurških intervencija.

Oprez i prethodna konsultacija sa lekarom su potrebni kod osoba sa gastrointestinalnim lezijama ili ulkusom, pre operativnih zahvata i pri istovremenom uzimanju antikoagulantnih i antiinflamatornih lekova.

Potrebitno je konsultovati lekara ako se koristi 1 kapsula dnevno duže od 4 nedelje ili 2 kapsule dnevno duže od 7 dana.

Proizvod sadrži **laktozu** koja se koristi u postupku fermentacije enzima serapeptidaze.
Proizvod nije namenjen deci, trudnicama i dojiljama.

Način čuvanja:

Čuvati u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti i vlage na temperaturi do 25°C.

Neto količina:

10 kapsula 2,05 g

20 kapsula 4,10 g

30 kapsula 6,15 g

Pakovanje:

10 kapsula

20 kapsula

30 kapsula

Proizvođač:

Pharmanova d.o.o.

Industrijska 8, 11500 Obrenovac, Republika Srbija

3203330-2

